



Formulácia prípravku Medax® Max je navrhnutá tak, aby ste prípravok nasypali priamo do primiešavacej nádrže postrekovača. Nerozpúšťajte prípravok Medax® Max s vodou zvlášť vo vedre pred nasypáním do primiešavacieho zariadenia. Zabráňte nasiaknutiu prípravku vodou.

# Tank-mix: správny postup

- 1 Naplňte približne ½ nádrže postrekovača vodou



- 2 Zapnite primiešavacie zariadenie na strednú až vysokú intenzitu, aby sa Medax® Max rýchlo rozpustil. Uistite sa, že voda preteká v primiešavacej nádobe i po jej stenách pred pridaním prípravku. Odporúčame dodržiavať dostatočný prietok vody, aby bol prípravok rozpustený a odstránený z primiešavacieho zariadenia.



- 3 Postupne nasypete Medax® Max priamo do prúdu vody, pričom prispôbete rýchlosť sypania rýchlosti rozpúšťania. **Odporúčame pomalé sypanie krúživým pohybom! Nesypete prípravok príliš dlho na jedno miesto. Zabezpečíte si tým plynulé rozpúšťanie v prúde vody a vyhnete sa lokálnemu upchatiu.**

**NESYPTE Medax® Max priamo do primiešavacej nádrže BEZ DOSTATOČNÉHO PRIETOKU VODY A PREMIEŠAVANIA v NÁDRŽI**



Pridávajúte prípravky v poradí: 1. prípravok proti peneniu, ak je to nutné; 2. hnojivo, stopové soli (pevné); 3. pevné formulácie; 4. kvapalné formulácie; 5. rozpúšťadlá, emulzie, koncentrát

pevné  
alebo  
kvapalné  
hnojivo



pevná formulácia

WG / WP  
SG / SP




kvapalná formulácia

SC / CS / SL / SE / EW  
EO / EC / OD / DC / ME

- 4 Doplňte vodu do postrekovača, pridajte zmáčadlo (podľa formulácie).

- 5 Vypláchnite obal



- 6 Obal pevne uzatvorte



- 7 Kontinuálne premiešavajte nádrž. Ak je Medax® Max pridaný do nádrže postrekovača, mal by byť kontinuálne premiešavaný a čo najskôr aplikovaný.



**Medax® Max**

Maximálna flexibilita

**BASF**

We create chemistry